

Aus der Universitäts-Frauenklinik zu Jena
Direktor Professor Dr. Henkel

Kritische Betrachtungen über die Veränderungen der kindlichen Herztöne beim Eintritt des Kopfes in ein enges Becken

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen
Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Vorgelegt von

Heinz Wittig

aus Jena

1935

Druck der Gutenberg-Druckerei Arnstadt, Bürger & Wiedmer, Vor dem Riedtor 3

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät.

Prof. Guleke.

Dz. Dekan.

Gutachter: **Prof. Herold.**

Jena, den 24. Juni 1935.

Kritische Betrachtungen über die Veränderungen der kindlichen Herztöne beim Eintritt des Kopfes in ein enges Becken.

Zahlreiche Arbeiten findet man in der Literatur über die Physiologie und Pathologie der kindlichen Herztöne unter der Geburt, dagegen sehr wenige systematische Untersuchungen der kindlichen Herztätigkeit in der Phase des Eintrittes des Kopfes in das Becken. Und doch ist gerade diese Phase des Eintrittes für die fetale Herztätigkeit von Bedeutung, besonders beim verengten Becken. Nicht die mannigfaltigen Erscheinungsformen der kindlichen Herztätigkeit sub partu und deren Entstehungsbedingungen stehen hier zur Erörterung, sondern die vorliegenden Untersuchungen berücksichtigen nur die Veränderungen der kindlichen Herztöne beim Eintritt des Kopfes in ein enges Becken.

Als erster hat Gauß das Verdienst, im Jahre 1905 auf einen geburts-hilflichen Vorgang bei Geburten mit engen Becken hingewiesen zu haben, den er als Eintrittseffekt bezeichnet. Unter diesem Phänomen versteht Gauß „jenen Augenblick, wo der vorangehende Kopf nach langem Verharren im Beckeneingang verhältnismäßig schnell, sozusagen mit einem Ruck in das Becken eintritt“, wobei gleichzeitig eine Gefährdung des Kindes hinzukommt. Als intrauterine Gefährdung des Kindes führt Gauß folgende Symptome an: „Nabelschnurvorfal, dauerndes Sinken der kindlichen Herztöne in der Wehenpause unter 100 Schlägen in der Minute, dauerndes Steigen derselben in der Wehenpause über 160 Schläge in der Minute, starkes Schwanken der Herztöne um mehr als 40 Schläge, auffallende Irregularität der Herztöne, Meconiumabgang“. Einige Jahre später stellte Raymann (1914) auf Veranlassung von Gauß an der Freiburger Universitäts-Frauenklinik Untersuchungen über die Gefährdung des neugeborenen Kindes, speziell beim engen Becken an. Hier war das kindliche Leben in 113 Fällen (21,1%) bei 535 Geburten mit engen Becken gefährdet, während der Eintrittseffekt bei 6 Geburten (d. h. 1,1% aller Geburten bei engen Becken bez. 5,3% der gefährdeten Geburten) nachgewiesen werden konnte. Solbach knüpfte im Jahre 1920 ebenfalls an der Freiburger Universitäts-Frauen-

linik an die Raymann'schen Erhebungen an und beschäftigte sich eingehender mit dem Einfluß des Eintrittseffektes auf das Befinden des Kindes sub partu. Diese Untersuchungen umfassen ein Material von 7597 Geburten, darunter 772 Geburten (10,16%) von engen Becken mit einer Gefährdung des ungeborenen Kindes von 37,56% (261 Fälle). Der Eintrittseffekt wurde in 6 Fällen, das sind 0,8% aller Geburten beim engen Becken bez. 2,3% der gefährdeten Geburten festgestellt. Esch weist 1925 in seiner Arbeit „Ueber das Zustandekommen und den Einfluß des Hirndruckes auf das Verhalten der kindlichen Herztöne während der Geburt“ auf mehr oder weniger stark verlangsamte Herztöne beim Eintritt des Kopfes in ein verengtes Becken hin. Auch bei Willibald findet sich in seinen Untersuchungen (1932) aus der Esch'schen Klinik ein Hinweis auf eine Verlangsamung und gelegentliche Beschleunigung der fetalen Herztöne beim Passieren des Beckeneinganges. Als letzter führt Weiß (1932) bei 5646 Geburten in der Würzburger Universitäts-Frauenklinik 50 Fälle mit Eintrittseffekt an. Allerdings kommen bei Weiß von den angeführten 50 Geburten nur 31 Fälle hier in Frage, bei denen der Eintrittseffekt in eindeutiger und exakter Weise festgestellt werden konnte. Damit ist meines Erachtens die Zahl der früheren Arbeiten über den Eintrittseffekt erschöpft. Zu erwähnen wäre vielleicht noch die Uter'sche Veröffentlichung, die sich aber ausschließlich nur mit den therapeutischen Folgerungen von Gauß auseinandersetzt. Sie soll deshalb noch an anderer Stelle berücksichtigt werden.

Eigene Untersuchungen.

Das zu den vorliegenden Untersuchungen benutzte Material stammt aus der geburtshilflichen Abteilung der Jenaer Universitäts-Frauenklinik und umfaßt einen Zeitraum von 1925—1931 mit 3965 Geburten. Davon sind 1386 Geburten bei verengten Becken. Auf Grund genauester Beobachtung des Verlaufes und der kurvenmäßigen Kontrolle der kindlichen Herztöne konnten von den 1386 Geburten bei verengten Becken 765 Fälle für die Untersuchung zugrunde gelegt werden. Unberücksichtigt blieben selbstverständlich alle die Fälle, bei denen mit der Möglichkeit anderer Ursachen wie: Hofmeier'sche Impression, Fieber unter der Geburt, Nabelschnurumschlingung, zu kurze und zu lange Nabelschnur, Poly- und Oligohydramie, Placenta praevia, und vorzeitige Lösung der Placenta gerechnet werden mußte. Fernerhin die Sectiones Caecareae, da hierbei ein Eintritt des Kopfes in's Becken nicht in Frage kommt. Schließlich noch alle die Geburten, bei denen an Hand der Krankengeschichten und der Herztonkurven ein Eintritt des Kopfes in's Becken sich nicht eindeutig und exakt feststellen ließ. Daher erklärt sich auch die relativ geringe Zahl von 765 bei 1386 Geburten mit engen Becken. Unterzieht man nun die kindlichen Herztöne ganz allgemein einer genauen und sorgfältigen Kontrolle im Augenblick des Eintrittes des kindlichen Kopfes in's verengte Becken, so sieht man doch sehr oft auffallende Schwankungen der Herzschlagfrequenz. Dabei erleichtert die an der Universitäts-Frauenklinik Jena seit Jahren übliche genaue kurvenmäßige Darstellung der kindlichen Herztöne außerordentlich die Arbeit. Die fetalen Herztöne werden in der hiesigen Klinik vor der Austreibungsperiode aller 10 Minuten, während der Austreibungsperiode nach jeder Wehe gezählt und auf eine Kurve eingetragen. Als Mittel der normalen Schlagfrequenz des kindlichen Herzens wurden 140 Schläge in der Minute zugrunde gelegt. Hier zeigt sich bei den genau beobachteten 765 Fällen von Kopflagen 139 mal eine Änderung der fetalen Herztonfolge beim Eintritt des kindlichen Kopfes ins Becken, indem die Schwankungsbreite für das Absinken der Herztöne 14—72, für das Steigen 14—44 Schläge in der Minute betrug. Die erste

Gruppe umfaßt 133, letztere nur 6 Fälle. Zur besseren Anschauung dienen folgende Tabellen:

Tabelle 1.

Abfinden der kindlichen Herztöne beim Eintritt des Kopfes in's Becken.

Jahr	Abfinden der Herztöne um:																		
	14	16	18	20	22	24	28	30	32	36	40	44	48	52	56	58	64	72	
1925	1	2	—	5	1	2	5	—	3	2	—	—	1	1	—	1	2	1	27
1926	—	6	1	6	1	1	5	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	25
1927	—	4	1	3	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	12
1928	—	8	—	8	—	2	2	1	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	28
1929	1	3	—	6	1	2	—	1	—	2	3	—	—	1	—	—	—	—	20
1930	1	4	—	3	—	2	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	15
1931	—	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6
Sa.	3	28	2	31	3	13	13	2	8	6	9	2	5	3	1	1	2	1	133

Tabelle 2.

Ansteigen der kindlichen Herztöne beim Eintritt des Kopfes in's Becken.

Jahr	Ansteigen der Herztöne um:					Zahl der Fälle
	16	20	24	28	44	
1925	—	—	—	1	—	1
1926	—	—	—	—	—	—
1927	—	—	—	—	1	1
1928	—	1	—	—	—	1
1929	—	—	1	—	—	1
1930	—	—	1	—	—	1
1931	—	—	—	—	1	1
Summe	—	1	2	1	2	6

Aus diesen beiden Zusammenstellungen sieht man sofort das starke Überwiegen der Verlangsamung der kindlichen Herzschlagfrequenz gegenüber der Beschleunigung. Das Abfinden um 16, 20 und 24 Schläge in der Minute überwiegt bei weitem. Ein deutlicher Unterschied von Erst- und Mehrgebährenden besteht nicht.

Der Eintrittseffekt.

Ganz besondere Aufmerksamkeit galt dem Gauß'schen Eintrittseffekt, jenem Augenblick, wo der vorangehende Kopf nach langem Verharren im Beckeneingang mit einem Ruck in das Becken hineintritt. Das Vorhandensein dieses Phänomens wurde auch bei den eigenen Untersuchungen wiederholt festgestellt. Es muß nochmals betont werden, daß es sich hier um ganz genau kontrollierte Fälle handelt, bei denen die Feststellung dieses Vorganges in eindeutiger Weise möglich war unter Ausschluß aller anderen Möglichkeiten für die Ursache des Eintrittseffektes, wie: Nabelschnur, Fruchtwasser und Placentaanomalien, Hofmeier'sche Impression, Wehenmittel, Unregelmäßigkeiten von Lage und Haltung des Kindes. Wie weit diese Punkte von Gauß, Raymann, Solbach berücksichtigt worden sind, läßt sich nicht genau feststellen. Von den 50 Fällen der Weiß'schen Publikation, der sie in 5 Gruppen einteilt, können nur die erste mit 31 und die dritte Gruppe mit 10 Fällen hier herangezogen werden. Die übrigen Gruppen enthalten gerade die Momente, die hier außer Acht gelassen worden sind. Schließt man alle diese angeführten anderen Möglichkeiten als Ursache des Eintrittseffektes aus, so ergeben sich bei den eigenen Untersuchungen 34 Geburten mit Eintrittseffekt. (Vgl. hierzu Tabelle 9). Das wären 4,44%, bezogen auf die erwähnten 765 Fällen von Schädellagen bei engen Becken. Dieser Wert weicht von Raymann (1,1%) und Solbach (0,8%) erheblich ab. Bezieht man dagegen die 34 Eintrittseffekte auf die Gesamtheit der klinischen Geburten von 3965 in den Jahren 1925 bis 1931, so ergibt sich daraus eine Häufigkeit von $0,85\% = 1:116,6$. Hierbei findet man eine auffallende Übereinstimmung mit den neueren Berechnungen von Weiß, der eine Häufigkeit des Eintrittseffektes von $0,885\% = 1:113$ feststellt, bezogen auf eine Gesamtzahl von 5645 klinischen Geburten. Tabelle 3 und 4 führen dies klar vor Augen.

Tabelle 3.

Eintrittseffekt, bezogen auf Schädellagen mit engem Becken.

Autor	Anzahl der Geburten mit engen Becken	Anzahl der Eintrittseffekte	% Zahl
Raymann	535	6	1,1%
Solbach	772	6	0,8%
Wittig	765	34	4,44%


Tabelle 4.

Eintrittseffekt, bezogen auf die Gesamtzahl der klinischen Geburten.

Autor	Gesamtzahl der Geburten	Anzahl der Eintrittseffekte	% Zahl
Weiß	5645	41	0,885%
Wittig	3965	34	0,857%

Worauf beruht nun der große Unterschied im ersten Fall? Man geht wohl nicht fehl, wenn man als Ursache die Häufigkeit der engen Becken und hier wiederum die der rachitisch-platten Becken mit in Erwägung zieht. Während im allgemeinen verengte Becken bei etwa 10—15% aller Gebährenden vorkommen, weist die Henkel'sche Klinik eine Häufigkeit von etwa 29% auf, die allerdings in den letzten Jahren immer mehr abnimmt. Auch Weiß bemerkt, daß die Häufigkeit der Eintrittseffekte bei engen Becken sicher noch weit größer sei.

Noch besser und übersichtlicher kommt der Eintrittseffekt bei der kurvenmäßigen Darstellung in Erscheinung. Deshalb sollen von den zahlreichen vorhandenen Herztonkurven des Untersuchungsmaterials 4 Kurven hier wiedergegeben werden, besonders auch deshalb, weil bisher nur einmalig, und zwar von Gauß, der plötzliche Eintritt des kindlichen Schädels in's Becken kurvenmäßig dargestellt worden ist. Die Kurven zeigen in der Ordinate die Anzahl der kindlichen Herztöne, in der Abszisse die Zeitangabe des Geburtsverlaufes an.



Kurve 1.

*Tetale Herztonkurve
mit Eintrittseffekt.*

Spontangeburt.

*II. Para, 24 Jahre,
Kind lebensfrisch.*

□ Blasensprung

▲ nach Eintritt

○ Geburt

Kurve 2.

*Tetale Herztonkurve
mit Eintrittseffekt.*


Spontangeburt.

*II. Para, 27 Jahre,
Kind lebensfrisch.*

□ Blasensprung

▲ nach Eintritt

○ Geburt




Kurve 1 und 2, besonders aber Kurve 1 geben uns ein anschauliches und eindrucksvolles Bild von den schlagartigen Absinken der kindlichen Herztöne

unmittelbar nach dem Eintritt des Kopfes ins Becken. Es folgt bei beiden Kurven die Spontangeburt eines lebensfrischen Kindes.

Ein ähnliches Bild bietet uns der nächste Fall (*Kurve 3*). Auch hier zeigt die Herztonkurve einen ungeheuren Absturz der kindlichen Herztöne um nicht weniger als 64 Schläge in der Minute, um dann sofort wieder zurückzuschnellen. In diesem Fall kam ein bleich asphyktisches Kind mit Hilfe des Kristeller'schen Handgriffes zur Welt.

Kurve 4 zeigt insofern eine Besonderheit, als hier Eintritt und Blasenprung zeitlich zusammenfallen. Daß hierbei eine Beeinflussung auf das Absinken der kindlichen Herztöne infolge Blasenprung stattgefunden hat, ist kaum anzunehmen, da bei allen übrigen Fällen ein bemerkenswertes Absinken der kindlichen Herztöne infolge Blasenprunges nicht festgestellt werden kann. Auffallend ist weiterhin bei diesen Herztonkurven die starken Schwankungen der Herztöne um die Mittellage von 140 Schlägen in der Minute vor dem Eintritt des Kopfes in ein enges Becken. Sie geben ein anschauliches Bild für die plastische Umformung und Anpassung des kindlichen Schädels an das für ihn zu enge Becken. An Hand dieser für den Eintrittseffekt typischen Kurve entsteht die Frage, ob das Kurvenbild beim normalen Becken ähnliche Schwankungen aufweist. Hier sehen wir einen großen Gegensatz zum Eintrittseffekt. *Kurve 5* führt diesen Gegensatz deutlich vor Augen. Während des ganzen Geburtsver-



Kurve 3.

*Fetale Herztonkurve
mit Eintrittseffekt.*

I. Para, 23 Jahre.

Vorzeitiger Blasensprung.

Expression nach Kristeller.

Kind schwer asphyktisch.

▲ nach Eintritt

○ Geburt


Kurve 4.

*Fetale Herztonkurve
mit Eintrittseffekt.*


II. Para, 25 Jahre.

Kind lebensfrisch.

- Blasensprung
- ▲ nach Eintritt
- Geburt



laufes eine gleichmäßige Schlagfolge der Herztöne ohne wesentliche Schwankungen. Auch alle übrigen Kurven bei normalen Becken ohne Mißverhältnis zwischen Kopf und Becken zeigen ebenfalls eine gleichmäßige Schlagfrequenz



Kurve 5.

*Fetale Herztonkurve
ohne Eintrittseffekt.*

Spontangeburt.

I. Para, 19 Jahre.

Kind lebensfrisch.

- Blasensprung
- ▲ nach Eintritt
- Geburt

oder nur ganz geringe Schwankungen der kindlichen Herztöne. In keiner Hinsicht läßt sich jedenfalls ein Eintrittseffekt weder durch den Eintritt des Kopfes ins Becken noch durch den Blasenprung nachweisen. Ebenso stehen die Schwankungen der Herztöne um die Mittellage von 140 Schlägen in der Minute vor dem Eintritt hier in gar keinem Verhältnis zu denen beim Eintrittseffekt.

Die Einwirkung des Kopfeintrittes in ein verengtes Becken auf die fetale Herzstätigkeit nach langem Verharren im Beckeneingang im Sinne eines plötzlichen Absinkens der kindlichen Herztöne unter 100 Schläge in der Minute, eines plötzlichen Absinkens um 40 Schläge oder vereinzelt eines Ansteigens über 160 Schläge konnte somit auch am eigenen Material bestätigt werden. Die Tatsache des Gauß'schen Eintrittseffektes steht also ohne weiteres fest. Dies wirft sofort die Frage auf, in welcher Weise er sich auch auf die Geburtsleitung auswirkt. Es ist bekannt, daß eine Beschleunigung der kindlichen Herztöne über 160 Schläge in der Minute im allgemeinen nicht gefährlich ist, und die Kinder diese Beschleunigung lange Zeit größtenteils ohne Schaden vertragen. Dagegen gilt eine Herzschlagverlangsamung unter 100 Schläge als ein Zeichen von großer Gefahr für das kindliche Leben. Daß letztere Auffassung einer großen Einschränkung bedarf, ergibt sich aus den folgenden Ergebnissen. Die jetzt folgende Übersicht über die an der Jenaer Klinik beobachteten 34 Fälle mit Eintrittseffekt zeigt die Art der Geburtsleitung.

Tabelle 5.
Geburtsleitung bei 34 Geburten mit Eintrittseffekt.

Konjervativ		A k t i v							
		Zange		Kristeller		Kristeller u. Zange		Ritgen-Olshausen	
Zahl	‰	Zahl	‰	Zahl	‰	Zahl	‰	Zahl	‰
27	79,4	1	2,9	4	11,8	1	2,9	1	2,9


Bei dieser Zusammenstellung fällt sofort die hohe Zahl der abwartend geleiteten Geburten auf im schroffen Gegensatz zu den sehr wenigen Zangen. Man erkennt auf den ersten Blick die konservative Einstellung der Henkel'schen Schule. Den 27 (79,4‰) konservativ geleiteten Geburten stehen nur 7 (20,6‰) Fälle mit einem geburtshilflichen Eingriff gegenüber. Außerordentlich klein ist die Anzahl der Zangen (1 = 2,9‰) und der Zangen mit Kristeller (1 = 2,9‰). Auch die Geburtsleitung der anfangs erwähnten 139 Geburten mit zum Teil

Übersicht über den Anteil der
Entbindungsverfahren bei
34 Geburten mit Eintrittseffekt.



 konservativ
 Zange
 Kristeller
 Kristeller und Zange
 Ritgen-Olshausen

Zustand der Kinder bei
34 Geburten mit Eintrittseffekt
unmittelbar post partum.



 lebensfrisch
 leicht asphyktisch
 schwer asphyktisch
 tot

recht erheblichen Schwankungen der kindlichen Herztöne beim Eintritt des Kopfes in ein enges Becken zeigt daselbe Bild.

Tabelle 6.

Geburtsleitung bei 139 Geburten bei engen Becken mit Schwankungen der kindlichen Herztöne (Ansteigen und Abfinken) beim Eintritt des Kopfes ins Becken.

Conservativ		A k t i v							
		Zange		Krißteller		Krißteller u. Zange		Ritgen-Olshausen	
Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
126	90,6	2	1,4	9	6,0	1	0,6	1	0,6

Die Zahl der spontan beendeten Geburten übertrifft um vieles die Geburten, bei denen ein geburtshilflicher Eingriff nötig wurde (126 = 90,6%). Wiederum fällt die außerordentliche geringe Zahl der Zangen (2 = 1,4%) und die eine Kombination von Zange und Krißteller (0,6%) auf. Die Krißteller'sche Expression kam 9 mal (6%) und einmal der Ritgen-Olshausen in Anwendung. Auch hier war „Abwarten“ oberstes Gesetz in der Geburtsleitung bei engen Becken.

Galt unsere Aufmerksamkeit bisher dem Geburtsverlauf und der Geburtsleitung, so sollen die folgenden Untersuchungen zeigen, welchen Einfluß der Eintrittseffekt als solcher und die daraus gezogenen Folgerungen für die Geburtsleitung auf den Zustand des Kindes nach der Geburt hat.

Tabelle 7.

Zustand der 34 Kinder mit Eintrittseffekt im Augenblick der Geburt.

Lebensfrisch		asphyktisch				tot	
		leicht		schwer			
Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
29	85,3	3	8,8	1	2,9	1	2,9

Bei 34 Kindern mit Eintrittseffekt kamen 29 (85,3%) lebensfrisch zur Welt. Eine einzige Geburt hatte letalen Ausgang. Der Rest von 4 Neugeborenen war unmittelbar nach der Geburt in 3 Fällen (8,8%) leicht und in einem Fall (2,9%) schwer asphyktisch.

Auch in der Geburtsleitung mit Schwankungen der kindlichen Herztöne sehen wir ähnliche Ergebnisse wie beim Eintrittseffekt. (Tabelle 8.)

Tabelle 8.

Zustand der Kinder bei 139 Geburten bei engen Becken mit Schwankungen der kindlichen Herztöne beim Eintritt des Kopfes in's Becken.

Lebensfrisch		asphyktisch				tot	
		leicht		schwer			
Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
117	84,1	16	11,5	5	3,5	1	0,6

Hier wurden von 129 Geburten mit schwankenden kindlichen Herztönen 117 (84,1%) lebensfrisch geboren. 21 Kinder kamen asphyktisch zur Welt, 16 davon waren leicht und 5 schwer asphyktisch. Trotz teilweiser außerordentlicher Verlangsamung der kindlichen Herztöne unter 100 Schläge in der Minute wurde nur ein Kind (0,6%) tot geboren. Fast sämtliche Kinder sind trotz erheblicher Schwankungen der Herztöne infolge der abwartenden Haltung bei der Geburtsleitung am Leben geblieben.

Eine einzelne Aufzeichnung der 34 Eintrittseffekte mit genauen Angaben der Maße von Becken und Kind, der Alteration der fetalen Herzschlagfrequenz und ihre Folgen für die Geburtsleitung soll nochmals einen klaren Überblick geben. (Tabelle 9.)

Somit unterscheidet sich die geburtshilfliche Leitung der Jenaer Klinik ganz wesentlich von der Gauß'schen Klinik. Hier die vorwiegende konservative Geburtsleitung, dort die starke Aktivität. Von den 62 Geburten des Gauß'schen Materials wurden 24 (26%) konservativ und 38 (58%) operativ geleitet, im Gegensatz zu Jena, wo von 34 Geburten 27 (79,4%) konservativ und 7 (20,6%) operativ behandelt wurden. Besonders auffallend ist die hohe Zangenfrequenz. Während in der Jenaer Klinik die Indikation zur Zange nur zweimal bestand, wurde bei Gauß 22 Geburten durch die Zange entwickelt.

2.	1925	26	V.	20 : 25,5 : 28 : 18 : 10	136	92	140	fpontan
3.	1925	26	II.	21 : 25,5 : 32 : 19,5 : 7,75	152	80	156	"
4.	1925	21	I.	25,5 : 28,5 : 31 : 18,5 : 11	152	104	148	"
5.	1925	24	II.	24 : 28,5 : 30 : 18,5 : 9,5	120	68	120	"
6.	1925	21	II.	19 : 24,5 : 28 : 19,5 : 8,25	146	80	80	Krist. u. Zg
7.	1926	24	III.	22,5 : 26,5 : 31 : 18,5 : 9,5	132	84	96	fpontan
8.	1926	27	I.	22,5 : 26,5 : 29 : 20,5 : 10,25	120	80	88	"
9.	1926	38	I.	23 : 28,5 : 32 : 20 : 10,75	132	76	100	Kristeller
10.	1926	18	I.	23,5 : 26 : 31,5 : 18 : 8,75	120	90	120	Ritg.-Olsh.
11.	1926	19	I.	20 : 24,5 : 28,5 : 20 : 10,75	136	96	108	fpontan
12.	1926	23	I.	25,5 : 29,5 : 19 : 31 : 10,5	120	80	66	"
13.	1926	16	I.	23 : 27 : 29,5 : 18 : 9,5	128	80	96	"
14.	1927	38	VII.	20 : 28 : 31 : 17,5 : 8,75	144	80	96	"
15.	1927	26	II.	23 : 28 : 32 : 21 : 9,75	148	96	100	"
16.	1928	23	I.	22,5 : 23 : 31,5 : 20,5 : 9,75	128	80	144	Kristeller
17.	1928	17	I.	25 : 28 : 31 : 19 : 9,5	130	96	128	fpontan
18.	1928	20	I.	20 : 25 : 30 : 18,5 : 10,25	132	94	104	"
19.	1928	23	II.	21 : 26,5 : 31 : 19 : 9,25	120	72	96	"
20.	1928	33	III.	25 : 29,5 : 31 : 20 : 9,5	140	96	104	"
21.	1928	22	I.	25 : 29,5 : 32 : 17,5 : 9,25	144	98	104	"
22.	1929	22	I.	24 : 25,5 : 27 : 18 : 8,25	128	60	72	Kristeller
23.	1929	33	IV.	27 : 28,5 : 34 : 20 : 10	116	80	92	fpontan
24.	1929	19	II.	25,5 : 28 : 30 : 20,5 : 10,5	110	70	104	"
25.	1929	31	III.	24,5 : 27 : 32 : 18,5 : 9,75	140	98	120	"
26.	1929	29	I.	24 : 26 : 29 : 20 : 10	136	84	120	"
27.	1929	26	I.	26,5 : 30 : 31,5 : 18 : 9,25	132	92	96	"
28.	1929	27	IV.	24 : 28,5 : 31,5 : 19,5 : 9,25	140	98	60	"
29.	1929	18	I.	22 : 25 : 33 : 20 : 10	128	90	116	"
30.	1929	25	II.	27 : 28,5 : 31 : 20 : 9	144	80	112	"
31.	1930	21	I.	25 : 26,5 : 29 : 19 : 10	128	80	108	"
32.	1930	30	II.	23 : 27 : 31,5 : 18 : 8,25	140	98	98	"
33.	1930	28	I.	22,5 : 26,5 : 29,5 : 19 : 9,75	156	98	140	"
34.	1931	29	III.	23 : 25,5 : 29 : 18 : 10	140	92	118	Zange

sfri ch	31	9	37	12	33	10	7	8,5	2480	48
	33,5	9,5	40	13,5	36,5	12	7,5	9	3300	54
	32	9	38	13	34	11	7	8,5	3100	50
	32	9,5	38	13	35	11,5	8,5	9,75	2520	47
	32	9	38	13	34	11,5	7,5	8,5	2850	50
	33,5	9,5	39	12,5	35	11	7,5	9	3240	52
	32	9	38,5	13	36	11,5	7,5	9	3350	52
	32	9,5	39	14	36	12	8	9	3380	53
asph.	28,5	9	38	13,5	33	11	7	8	2860	51
sfri ch	32	9	38	13,5	34,5	11	7	9	2900	52
	32	10	39	13,5	35	12	7,5	9,5	3100	52
	30	9,5	37	13,5	32,5	10	7,5	8,5	2830	51
	32,5	9	39	12	36	11	7	8,5	2840	49
	31	9,5	39	13	34	11	8	9	3150	52
	29	8	36	11,5	32,5	10	7	8	2340	49
	29,5	9	37,5	13	33,5	11	6,5	8	2960	51
	30	9	37	13	33	10,5	7	8,5	2590	48
asph.	31,5	9,5	39	14	36	12,5	7,5	9,5	3120	50
	34,5	10	41	14,5	37,5	12	8	10	4120	57
	30,5	9	40	13,5	34	11	7	8	3050	51
	32	10	39	14,5	34	11,5	7,5	9	3520	51
	30	9,5	38	13	34	11,5	7,5	9	3650	53
asph.	30	9	36,5	13,5	33	11,5	7	9	3000	51
sfri ch	32	10	38	13	34	12	7,5	9	3250	52
	31	9	37	13	33,5	11	7,5	9	3050	50
	30,5	9	36,5	12	33,5	11	7	9	2650	50
	34	10	41	14	36	11	7	9,5	3770	55
	33,5	9,5	39	14	34	12	8,5	9,5	3900	53
	31	9	38	13	34	11	7	8	3630	53
	31	10	40	14	36,5	13	8	9	3450	49
	30	9,5	36	13	33,5	11,5	7	8,5	2960	51
asph.	29,5	9,5	38	14	34,5	11,5	8	9,5	3570	49
	31	9	39	13,5	36	12	7,5	9	3000	53

Folgerung für die Therapie.

Das Ergebnis der genau durchgeführten Untersuchungen bestätigt somit erneut die Tatsache des Gauß'schen Eintrittseffektes, auch seine Einwirkung auf die fetale Herzschlagfrequenz: Wichtiger aber, als sein Vorhandensein als solcher ist die Folgerung für das therapeutische Verhalten. Bedeutet das plötzliche starke Herabsinken der kindlichen Herztöne wirklich eine so große Gefahr für das Kind, daß nach Gauß eine Indikationserweiterung für die Zange gerechtfertigt erscheint? Auf Grund seines Materials glaubt Gauß die Frage bejahen zu müssen. Und in der Tat kann man bei seinem Material, besonders was die tabellarische Zusammenstellung anbelangt, in Versuchung kommen, die relativ hohe Zahl von Scheintot ($26 = 41,9\%$) und tot ($4 = 6,5\%$) geborenen Kinder auf das Konto des Eintrittseffektes zu setzen, wenn dieselbe Tabelle nicht auch gleichzeitig die hohe Frequenz der operativ behandelten Geburten (13 Zangen, 3 Kristeller und eine Wendung mit folgender Extraktion) hervorheben würde. Gerade diese Zusammenstellung scheint mir doch sehr dagegen zu sprechen, zumindest große Bedenken hervorzurufen. Den Eintrittseffekt als Ursache für die hohe Zahl der Asphyxie und der totgeborenen Kinder anzuführen und dadurch eine außerordentliche Gefährdung des Kindes hervorzuheben, ist meiner Ansicht nach doch sehr gewagt. Auch Uter hebt in seiner Arbeit mit Recht hervor, daß „ein schlüssiger Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang von Eintrittseffekt und Asphyxie nicht erbracht sei“. Parallel der großen Anzahl von operativen Entbindungen geht die Zahl der totgeborenen Kinder. Von 62 Solbachkindern hatten 4 letalen Ausgang. Davon wurden 3 mit der Zange entwickelt und ein Kind durch Expression und Episiotomie geboren. Leider wurden von den 3 Zangengeburtten nur ein Kind obduziert, wobei sich eine Fissur des Scheitelbeines zeigte. Wenn auch der außerordentliche schwere Geburtsverlauf die Fissur im Sinne von Gauß erklärt, so läßt sich das doch nicht ohne weiteres auf die beiden nicht obduzierten Kinder übertragen. Berücksichtigt man das geburtshilfliche Verhalten und das Ergebnis an der Jenaer Klinik,

dann muß man doch ohne weiteres annehmen, daß die Schädigung des Kindes bei Gauß ihre Ursache in der starken Aktivität hat. Außerdem ist bei der Gauß'schen Statistik noch sehr auffallend, daß bei den Kindern mit zuwartender Geburtsleitung keine Totgeborenen zu verzeichnen sind. Weiterhin ist auch in der Arbeit von Weiß sehr bemerkenswert, daß in 6 Fällen die Spontangeburt abgewartet wurde, obgleich die kindlichen Herztöne sich nach dem Eintritt des Kopfes in's Becken nicht erholt hatten, trotzdem lebensfrische Kinder zur Welt kamen. Alle diese Tatsachen bekräftigen doch keineswegs die Forderung nach einer Indikationserweiterung für die operative Geburtsbeendigung beim Eintrittseffekt. Unsere Erfahrungen jedenfalls zwingen uns, diese Forderung abzulehnen.

Erklärung des Eintrittseffektes.

Zuletzt soll noch einiges über die Erklärung des Eintrittseffektes gesagt werden. Im allgemeinen wird für die fetale Herzschlagverlangsamung eine Störung des Gasaustausches zwischen Mutter und Kind angenommen, die bei dem Foetus eine Kohlenäureanhäufung und dadurch eine Vagusreizung bedingt. Diese Ansicht findet man besonders in den Arbeiten von Bertram, Sachs und Seitz vertreten. Als ein weiteres Moment wird eine Gehirndruckerhöhung angeführt. Einmal kann durch fortdauernden und starken Druck die Beschleunigung der Herztöne infolge Vagusreizung in eine Verlangsamung übergeben (Willibald). Zum anderen wird durch langandauernde und intensive Kompression des Schädels der Sinus Sagittalis komprimiert. Dadurch wird der Blutabfluß aus den Großhirnhemisphären gehemmt und es tritt durch ein sich anschließendes Oedem der Hirnsubstanz und Hirnhäute eine Volumvermehrung des Schädelinhaltes ein (Esch). Ebenso sehen auch Frey, Riehl, Weinzierl, Kautsky, Biehle und Grunewitsh als Ursache der Pulsverlangsamung den Hirndruck an. Auch L. Seitz, obwohl er in der Regel eine Herzschlagverlangsamung durch intrakraniellen Druck ablehnt, gibt ihn in seltenen Fällen zu. Er spricht von einer „reparablen Lageveränderung der Moleküle im ganzen Zentralnervensystem“, was einer Gehirnerschütterung gleich zu setzen wäre. So haben Naunyn und Schreiber im Tierexperiment durch eine „schnell eintretende, energisch wirkende, kurz dauernde Schädelkompression“ eine Pulsverlangsamung hervorrufen können. Dies wäre vielleicht beim Eintrittseffekt der letzten starken Wehe gleichzusetzen, die den kindlichen Kopf durch stärkste Kompression des Schädels in die Beckenweite hineintreibt. Auffällig dabei ist nur, warum die Störung gerade in dem Augenblick eintreten soll, wo der Kopf des Kindes nach dem Eintritt in das weite Becken von dem durch die lange Configurationsperiode hervorgerufenen intrakraniellen Druck befreit ist. In jüngster Zeit ist man zu einer anderen Ansicht gekommen, die hauptsächlich von Gauß und Solbach vertreten wird. Entsprechend dem schon

angedeuteten Widerspruch, daß die Störung der kindlichen Herzschlagfolge nicht in dem Augenblick des höchsten Hirndruckes, sondern erst nach Überwindung des Widerstandes eintritt, führt man eine negative Commotio cerebri als Ursache hierfür an, das heißt, die Pulsverlangsamung tritt nicht im Augenblick des höchsten Druckes (positive Commotio cerebri) ein, sondern erst, nachdem der Widerstand überwunden ist, also nach dem Höchstdruck (negative Commotio cerebri). Man könnte daran denken, daß sofort nach der Druckentlastung plötzlich eine bessere Durchblutung des Gehirns, vielleicht sogar eine Blutüberfüllung (Solbach) erfolgt, die wiederum eine Herzschlagverlangsamung auslöst.

Ob der Eintrittseffekt durch einen starken Überdruck im Beckeneingang oder durch plötzliche Druckdifferenz beim Eintritt des Kopfes in's Becken, vielleicht auch durch Zusammenwirken beider Momente bedingt ist, läßt sich bis heute noch nicht mit Sicherheit feststellen. Ich möchte mich der Ansicht von Gauß anschließen, da mir die negative Commotio cerebri am wahrscheinlichsten erscheint.

Zusammenfassung.

Fassen wir nun die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen noch einmal kurz zusammen, so ergibt sich folgendes:

1. Das Vorhandensein des Gauß'schen Eintrittseffektes wird bestätigt.
2. Dieses Phänomen wurde bei 765 Geburten mit engen Becken 34 mal (4,44%) beobachtet. Bezogen auf die Gesamtheit von 3965 klinischen Geburten in den Jahren 1925—1931 ergab sich eine Häufigkeit von $1 : 116,6 = 0,857\%$.
3. Die konservative Geburtsleitung beim engen Becken und Eintrittseffekt hat sich erneut als richtig erwiesen.
4. Eine Indikationserweiterung für die operative Geburtsleitung beim Eintrittseffekt besteht nicht.
5. Als Erklärung des Eintrittseffektes ist eine negative Commotio cerebri sehr wahrscheinlich.

An dieser Stelle möchte ich Herrn Professor Henkel für die Überlassung des Themas und Herrn Professor Herold für die Anregungen und Übernahme des Referates meinen aufrichtigsten Dank aussprechen.

Literatur.

1. Bartram Zur Beurteilung der kindlichen Herztöne.
Zbl. f. Geb. 1922, Bd. 84.
2. Baum Etwas über kindliche Herztöne.
Arch. f. Gyn. 1917, Bd. 107.
3. Biehle Über die fetalen Herztöne bei Steißlagen.
Berichte 1917.
4. Eich Über das Zustandekommen und den Einfluß des
Hirndruckes auf das Verhalten der kindlichen Herz-
töne während der Geburt.
M[s]chr. f. Geb. 1925, Bd. 69.
5. Frey Verhalten der kindlichen Herztöne sub partu.
Z. f. Geb. 1925, Bd. 88.
6. Gauß Der Eintrittseffekt, ein bisher wenig bekannter
Geburtsvorgang. Z. f. Gyn. 1932, Nr. 1.
7. Henkel Die Geburt bei glatten Becken.
8. Henkel Die Indikation der Zangengeburt und ihre Technik.
Med. Klin. 1924, Nr. 33.
9. Henkel Ueber mehrfache Geburten derselben Frau mit
engen Becken. Z. f. Geb. 50 H. I. (1903).
10. Henkel Ueber die Leitung der Geburt.
Arch. f. Gyn. 134, 1928.
11. Henkel Wie soll sich der Praktiker beim engen Becken
verhalten? Aerztl. Rd[s]ch. 1932, Nr. 21.
12. Kautsky Eine neue Methode zur Sicherstellung von Zwi-
lings[s]chwangerschaften. Z. f. Gyn. 1921, Nr. 22.
13. Krehl Pathologische Physiologie. 6. Aufl., Seite 79.
14. Naunyn u. Schreiber Ueber Gehirndruck. Arch. f. exper. Pathol., Bd. 14.
15. Raymann Ueber die Gefährdung des ungeborenen Kindes,
[speziell beim engen Becken.
Inaug. Diss. Freiburg 1914.

16. Riehl u. Weinzierl . Beitrag zur Frage der fötalen Herzarhythmie.
Arch. f. Gyn. Bd. 130.
 17. Sachs Untersuchungen über die kindlichen Herztöne.
Geb. 1920, Bd. 82.
 18. Seitz Ueber fötale Indikation zur Zange.
Zbl. f. Gyn. 1916, Bd. 40.
 19. Seitz Ueber Hirndrucksymptome bei Neugeborenen in-
folge kranieller Blutungen und mechanischen In-
sulten. Arch. f. Gyn. 1907, Bd. 82.
 20. Seitz Die fötalen Herztöne während der Geburt.
Habilitationsschrift. München 1903.
 21. Siedentopf Intrauterine Beeinflussung der kindlichen Herztöne.
Zbl. f. Gyn. 1928, Bd. 52.
 22. Solbach Ueber Gefährdung des ungeborenen Kindes bei
engen Becken mit besonderer Berücksichtigung des
Verhaltens der kindlichen Herztöne beim schnellen
Eintritt des Kopfes durch den verengten Becken.
Inaug.-Diff. Freiburg 1920.
 23. Uter Ueber das therapeutische Verhalten beim Eintritts-
effekt. Zbl. f. Gyn. 1932, Nr. 20.
 24. Weiß Ueber die Gefährdung des Kindes beim plötzlichen
Eintritt des Kopfes in's Becken.
Z. f. Geburtsh. 103 H. 3 1932.
 25. Willibald Ueber die Veränderung der kindlichen Herztöne
unter der Geburt, ihre Ursachen und Folgen für
das Kind. Z. f. Geburtsh. 101 1932.
-

Lebenslauf.

Am 23. September 1905 wurde ich, Bruno Heinz Wittig, als Sohn des verstorbenen Graveurmeisters Bruno Wittig in Jena geboren. Besuchte vier Jahre die Volksschule und anschließend das Gymnasium in Jena, wo ich 1927 die Reifeprüfung bestand. Danach studierte ich in Jena Medizin und legte im Juli 1933 mein ärztliches Staatsexamen ebenfalls in Jena ab. Meine Praktikantenzeit verbrachte ich an der Medizinischen Universitätsklinik Jena und am Kreiskrankenhaus in Bad Oldesloe. Die Approbation als Arzt erlangte ich am 31. August 1934. Seit 1. Oktober 1934 bin ich am Städt. Krankenhaus Arnstadt als Assistenzarzt tätig.